

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

10 -  
BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

**ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE** (Tél. 47-22-87)

(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.

C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

Supplément n°4 au bulletin n°20 de mai 1962

29 mai 1962

## VIGNE

### AVERTISSEMENT

#### Mildiou

L'apparition des premières taches est notée. Dans tous les vignobles, effectuer un premier traitement avant le 6 juin.

### INFORMATIONS

#### Rougeot parasitaire

Le traitement ci-dessus est valable contre cette maladie.

#### Oïdium

Ajouter un produit mouillable à la bouillie anti-mildiou.

#### Acariose

De nombreux foyers sont toujours apparents. Les traitements effectués jusqu'à présent n'ont pas permis la suppression totale de ces foyers; de plus, le temps froid actuel n'est pas favorable à la bonne végétation de la vigne et les symptômes de cette affection sont toujours visibles. Eventuellement, on peut encore intervenir à l'aide d'un acaricide de contact ou systémique.

#### Vers de la grappe

Depuis une semaine le vol des papillons est signalé. Il est encore trop tôt pour intervenir éventuellement.

## ARBRES FRUITIERS

### INFORMATION

#### Oïdium

Renouveler le traitement à partir du 1er juin.

Imp. Châlons-s-M. 19.62 n°1513

P 1.4.1



GRANDE CULTURE

INFORMATIONS

COLZA D'HIVER

Charançon des siliques

Les conditions climatiques particulièrement défavorables n'ont en général pas permis, jusqu'à présent, la réalisation correcte du traitement contre ce parasite dont l'activité a d'ailleurs été entravée par le mauvais temps.

Exception faite pour certains colzas présentant encore une quantité notable de fleurs et de boutons (colzas affectés par la gelée ou ayant reçu de fortes fumures azotées), le traitement ne se justifie plus.

COLZA de PRINTEMPS

Meligèthes

Surveiller très attentivement les cultures dont la hampe florale est dégagée. Intervenir éventuellement avant tout dégât sérieux sur boutons. Les invasions de ces insectes étant en général très brutales sur colza de printemps, visiter fréquemment les cultures.

BETTERAVES

Pégomyie

Hormis certains secteurs particulièrement exposés, où des traitements ont déjà dû être réalisés conformément à nos précédents avis, l'évolution de ce parasite a été jusqu'ici contrariée par le mauvais temps.

Toutefois, les pontes très abondantes ont donné des éclosions massives depuis le 25 mai, même dans des régions habituellement indemnes.

Surveiller attentivement les cultures. Intervenir avant que les mines n'affectent 25 % de la surface du feuillage.

La première génération pouvant encore se prolonger quelque temps, il y a intérêt à différer autant que possible le traitement pour éviter une seconde intervention.

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles,

L'Inspecteur de la Circonscription  
Phytopathologique de REIMS,